n.o 29 deux pièces

Rapport d'une Observation de M. Gilbert Maitre en Chirurgie er en Chef de l'Hopital de Lectoure en Gascogne, du 7. 8bre. 1788, envoyée en datte du 9. Aout 1789. Sur une hernie Sciastique d'un volume extraordinaire du côté droit.

Mr. Gilbert rapporte que le nommé Jean Petit haut, des environs de sa ville, portoit depuis environ dix ans une tumeur à la fesse droite immédiatement à l'echancrure sciatique d'un volume considérable et de la figure d'un pain de Sucre, qui s'étendoit depuis la fesse jusqu'au creux du jarret; pour la quelle il n'a été consulté que lorsqu'elle a été parvenue à une certaine grosseur. Cette tumeur avoit été prise par plusieurs personnes de l'art pour une loupe, dont ils auroient entrepris l'extirpation, si le malade auparavant n'eut voulu consulter M. Gilbert; ce dernier, au premier coup d'œil, crut aussi que la tumeur, qui étoit tendue comme un balon, étoit une veritable loupe; mais après différens examens, il eut recours aux signes commémoratifs. Le malade lui ayant déclaré quil y avoit environ dix ans, qu'après avoir fait un violent effort pour Sauter un fossé, il s'étoit apperçu quelque tems après d'une petite tumeur indolente àla fesse, sans changement de couleur à la peau, qui disparoissoit lorsquil étoit couché; que depuis cinq ans la grosseur étant devenue plus considerable, malgré la situation quil avoit coutume d'observer, il ne pouvoit plus la faire rentrer; quil étoit fort géné par le poids énorme de la tumeur, dont il se soulageoit, en la pressant de bas en haut, cequi en même tems lui facilitoit le Succès de ses déjections, lorsquil avoit envie d'aller à la Selle.

M. Gilbert, tant par les signes commémoratifs que diagnostics bien convaincu de léxistence d'une hernie, quoique d'un volume extraordinaire, en entreprit la réduction par le taxis; mais son premier essai fut sans Succès, parcequ'il avoit mis le sujet dans la situation ordinaire aux autres hernies du bas-ventre, pour en faire la réduction;

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 d. 23 n°2

mais son intelligence lui suggéra aussitôt de faire mettre son malade dans une situation opposée. Le malade tourné sur le ventre portant à faux, la poitrine ainsi que la tête appuyés sur un oreiller, plus bas que le bas-ventre, les jambes flechies sur ses cuisses et les cuisses sur le bassin. alors Mr. Gilbert saisit la tumeur avec la main droite vers son sommet, il la pressa ainsi de bas en haut, et avec sa main gauche il pressa la tumeur en differens sens vers sa base; au premier taxis le malade rendit beaucoup de vents, en réitérant les mêmes mouvements il entendit un grouillement d'air dans le bas-ventre.

Au troisieme taxis, toutes les parties qui formoient la hernie rentrerent entierement et toute la peau de la cuisse, sous la quelle etoient contenues les parties sorties, resta aussi flasque qu'une vessie remplie d'air que l'on vient de percer.

M. Gilbert dit avoir ensuite appliqué un bandage à charniere sur l'ouverture qui avoit donné passage aux parties qui formoient la hernie, par le moyen du quel il les retint dans leur état naturel, le malade pouvant exercer facilement ses fonctions.

Réflexions

Je ne suis pas surpris qu'un gros volume des parties contenues dans le bas-ventre pouvant s'échaper tant par l'echancrure sciastique, aussibien que par le trou ovalaire, ainsi que par les autres –

ouvertures du bas-ventre, forment au dehors des tumeurs extraordinaires qui en imposent. Je ne prendrai pas pour ignorants les Chirurgiens qui ont été consultés avant M. Gilbert, pour avoir pris la tumeur pour une loupe. Nous avons parmi nous de nos confreres qui méritent la haute réputation qu'ils se sont acquise, qui, ayant été appellés en consultation pour une tumeur scrotale très volumineuse portée pendant plus de vingt ans, ont osé porter le trois-quart, sans en avoir rien tiré qu'un peu de sang; un an environ après, le sujet étant tombé malade et la mort ayant suivi de près la maladie, j'ai été à portée et curieux de savoir quelle etoit la nature de cette derniere tumeur. Par l'ouverture faite en presence de MM. de Saut et Leger 1er, nous avons trouvé que la tumeur etoit formée de tout l'intestin Ileum, cæcum et Colon, de l'Epiploum et de toute la portion du mesenterre au quel sont attachés tous ces visceres. Si l'Academie daigne en agréer l'observation détaillée, j'aurai l'honneur de la donner

Lorsque Mr Gilbert a eu fait la reduction de la hernie, du succès de laquelle il ne pouvoit pas se flatter, je ne crois pas qu'il eut tout prêt le bandage dont il a fait l'application; en conséquence il seroit à desirer de savoir comment il a contenu les parties jusqu'à son application et si le malade abandonné jusqu'à ce moment, les parties ont restées contenues, ou s'il a été obligé de recommencer les mêmes procédés de réduction avant que d'appliquer son bandage. Je sens la difficulté de contenir une pareille hernie, parceque l'ouverture qui permettoit un si gros volume de parties sans étranglement devoit être très dilatée. Celle du sujet de l'observation que je viens de demander d'agréer, auroit pu permettre l'introduction facile d'un gros œuf de canne.

L'observation de M. Gilbert est intéressante, elle est rare, elle merite d'être insérée dans les Mémoires de l'Academie. On ne peut que lui

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

faire des remerciements et le prier d'envoyer un double de son bandage, ainsi que de nous informer comment il a contenu les parties depuis la réduction jusquá l'exécution de son bandage et son application; et de nous dire aussi dans quel état est la peau sous la quelle étoient contenues les parties qui formoient la hernie; si elle a reprise son élasticité et si depuis l'observation envoyée; il ne se présente rien au dehors malgré l'application du Bandage.

Ce 19. 9bre 1789. Robin